



アビラテロン+プレドニゾン療法

1日1回

レジメン/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アビラテロン (1,000mg)※ 1日1回経口(連日服用)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
プレドニゾン (1回 5mg) 1日2回経口(連日服用)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※空腹時に服用。食事の1時間前から食後2時間までの服用は避ける。

副作用/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
疲労																												
ほてり																												
食欲不振																												
筋肉の痛み																												
しびれ																												
動悸・息切れ																												
吐き気・嘔吐																												

* 毎日起床時に血圧測定を行うことが望ましい。

※副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2025年10月現在の情報となります。

連絡先(医療機関名)