アナストロゾール+アベマシクリブ療法

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アナストロゾール（1mg）1日1回経口（連日投与）	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
アベマシクリブ（1回 150mg）1日2回経口（連日投与）	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
血栓塞栓症																												
肝機能障害																												
関節痛																												
性器出血																												
高コレステロール血症																												
ほてり																												
頭痛																												
嘔気																												
発疹																												
骨粗しょう症																												
下痢																												
骨髄抑制																												
疲労																												
腹痛																												
嘔吐																												
脱毛																												
食欲減退																												

注）アベマシクリブの重大な副作用として、間質性肺疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、本剤を中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。

副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2019DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.