ビカルタミド+リュープロレリン療法

4週間ごと

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ビカルタミド（80mg）1日1回経口（連日投与）	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
リュープロレリン（3.75mg）皮下注	↓																												↓			

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
肝機能障害																																
白血球減少																																
血小板減少																																
乳房腫脹																																
乳房圧痛																																
ほてり																																
発汗																																
勃起力低下																																
うつ状態																																
骨疼痛																																
脊髄圧迫																																
熱感																																
硬結（投与部位）																																

副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2019DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.