



### ビカルタミド+デガレリクス療法

4週間ごと

レジメン/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
ビカルタミド (80mg) 1日1回経口(連日投与)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
デガレリクス (初回240mg、2回目以降80mg) <sup>*</sup> 皮下注	↓																																	↓

※初回は240mgを1カ所あたり120mgずつ腹部2カ所に皮下投与する。2回目以降は初回投与4週間後より維持用量を投与する。4週間間隔で投与する場合は80mgを腹部1カ所に皮下投与する。

副作用/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
肝機能障害																																		
白血球減少																																		
血小板減少																																		
乳房腫脹																																		
乳房圧痛																																		
ほてり																																		
発汗																																		
勃起力低下																																		
注射部位疼痛																																		
体重増加																																		
発熱																																		
高血圧																																		

副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先(医療機関名)