レトロゾール単独療法

1日1回（術後内分泌療法の場合は5年～10年）

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
レトロゾール（2.5mg）1日1回経口（連日投与）	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
血栓症								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
狭心症								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
肝機能障害								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
コレステロール値増加																					■	■	■	■	■	■	■	■
ほてり								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
頭痛								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
関節痛								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
悪心								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
発疹								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
掻痒症								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
骨粗しょう症																						■	■	■	■	■	■	■

副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2018DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.