XELOX療法

3週間ごと（術後補助化学療法の場合は8コース）

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オキサリプラチン（130mg/㎡）点滴静注（120分）	↓																					↓						
カペシタビン（1回1,000mg/㎡）※ 1日2回経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※カペシタビン投与量：体表面積 1.36㎡未満1回1,200mg、1.36㎡以上1.66㎡未満1回1,500mg、1.66㎡以上1.96㎡未満1回1,800mg、1.96㎡以上1回2,100mg

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
骨髄抑制																												
疲労																												
腹痛																												
下痢																												
嘔気・嘔吐																												
口内炎																												
食欲不振																												
末梢神経障害																												
発疹																												
手足症候群																												

※副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2018DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.