mFOLFOX6療法

2週間ごと　(結腸がんにおける術後補助化学療法の場合は12コース)

レジメン/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オキサリプラチン (85mg/㎡) 点滴静注(120分)	↓														↓													
レボホリナート (200mg/㎡) 点滴静注(120分)	↓														↓													
5-FU (400mg/㎡) 急速静注(5分)	↓														↓													
5-FU (2,400mg/㎡) 持続静注(46時間)	→	→	→												→	→	→											

副作用/(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
嘔気・嘔吐	■	■	■	■											■	■	■	■										
食欲不振	■	■	■	■											■	■	■	■										
過敏症	■														■													
骨髄抑制													■	■	■	■	■	■	■	■	■							
口内炎			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■						
手足症候群			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
末梢神経障害															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

＊5-FU(フルオロウラシル)

※副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先(医療機関名)

Copyright © 2018DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.