mFOLFOX6＋セツキシマブ療法（KRAS遺伝子野生型）　2週間ごと

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
セツキシマブ（400→250mg/㎡）※ 点滴静注（120→60分）	↓							↓							↓							↓						
オキサリプラチン（85mg/㎡） 点滴静注（120分）	↓														↓													
レボホリナート（200mg/㎡） 点滴静注（120分）	↓														↓													
5-FU（400mg/㎡） 急速静注（5分）	↓														↓													
5-FU（2,400mg/㎡） 持続静注（46時間）	→	→													→	→												

※初回投与のみ400mg/㎡ 点滴静注120分、2回目以降は250mg/㎡ 点滴静注60分

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
嘔気・嘔吐	■	■	■	■											■	■	■	■										
食欲不振	■	■	■	■											■	■	■	■										
過敏症	■														■													
骨髄抑制													■	■	■	■	■	■	■	■	■							
口内炎			■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■							
手足症候群			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
末梢神経障害								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ざ瘡		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
皮膚乾燥		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
発疹		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
瘙痒症		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

＊5-FU（フルオロウラシル）

※副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2018DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.