mFOLFOX6療法　2週間ごと

レジメン/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オキサリプラチン（85mg/㎡）点滴静注（120分）	↓														↓													
レボホリナート（200mg/㎡）点滴静注（120分）	↓														↓													
5-FU（400mg/㎡）急速静注（5分）	↓														↓													
5-FU（2,400mg/㎡）持続静注（46時間）	→		→												→		→											

副作用/（日）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
嘔気・嘔吐	■	■	■												■	■	■											
食欲不振	■	■	■												■	■	■											
過敏症	■														■													
骨髄抑制													■	■	■	■	■	■	■	■	■							
口内炎			■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■						
手足症候群			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
末梢神経障害															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

＊5-FU（フルオロウラシル）

※副作用は、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度/程度、時期については個人差があります。

2019年9月現在の情報となります。

連絡先（医療機関名）

Copyright © 2018DAIICHI SANKYO ESPHA CO., LTD. All Rights Reserved.